

## 带状疱疹ワクチン資料 【剣淵町立診療所R6.4.1】

	生ワクチン（ビケン）	不活化ワクチン（シングリックス）
接種回数	1回	2回 （2回目は1回目の接種から原則2か月後、遅くとも6か月後までに接種する） 例外として、医師と相談の上1か月に短縮できる場合があります。
接種方法	皮下注射	筋肉内注射
有効性	50～59歳 69.8% 60～69歳 64.0% 70～79歳 41.0% 80歳以上 18.0% ※1	50～59歳 96.6% 60～69歳 97.4% 70～79歳 91.3% 80歳以上 91.4% ※2
予防効果	5～7年程度 ※1	10年以上 （11年目以降は延長試験を実施中） ※2
副反応	<p>◆頻度10%以上の副反応 発赤（44%）、そう痒感（27.4%）、熱感（18.5%）、腫脹（17%）、疼痛（14.7%）、硬結（13.5%）</p> <p>◆重大な副反応（いずれも頻度不明） アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎 ※3</p>	<p>◆頻度10%以上の副反応 疼痛（79.1%）、発赤（37.4%）、腫脹（24.2%）、筋肉痛（36.9%）、疲労（34.6%）、頭痛（28.3%）、悪寒（21.4%）、発熱（16.7%）、胃腸症状（12%）</p> <p>◆重大な副反応（いずれも頻度不明） ショック・アナフィラキシー ※3</p>
接種費用	6,800円	1回21,000円（2回42,000円）
助成額	なし	なし

※1 ZostavaxのSPS・STPS・LTPS試験(50歳代はZEST試験)。国内での有効性について試験を行っていないため、本質的に同じワクチンとされているZostavaxの試験結果から引用

※2 シングリックス試験

※3 医薬品添付文書